

Surveillance des populations de varroas Automne/hiver 2024

Partenariat entre GDS Centre et l'ADAPIC, cette prestation de suivi des varroas dans les colonies a pour objectif d'accompagner les professionnels dans leur lutte contre varroa tout au long de l'année. 10 colonies par rucher sont suivies sur 3 périodes clés : **début avril / juillet / début décembre**


Ci-dessous les résultats pour le comptage de début d'hiver (entre le 26 novembre et le 12 décembre)

 Les données présentées ne sont pas représentatives de la région et de ce qui se passe dans vos colonies.


C'est à chacun d'effectuer les comptages dans ses colonies pour connaître le niveau d'infestation

 **10 API**


 **12 RUCHERS**

 **114**

Répartition des ruches suivies par rapport aux seuils d'infestation



Répartition des ruchers suivis en fonction de leur situation parasitaire



Observations remarquables

- Constat simple : 11 ruchers sur 12 nécessitent un traitement d'hiver. Que les ruchers soient sédentaires ou transhumants, en bio ou en conventionnel la pression varroa est trop importante en cette fin d'année. Nous pouvons extrapoler à l'ensemble du cheptel régional : **En 2024 le traitement complémentaire d'hiver est plus que nécessaire.**
- Une fois de plus, certains ruchers ont été catégorisés « à traiter » alors qu'une colonie sur deux était à un faible niveau d'infestation. **Le traitement au cas par cas est envisageable mais cela implique de connaître le niveau d'infestation de chaque ruche** (rares sont les apiculteurs capables de faire un tel suivi), **c'est pourquoi nous incitons de traiter tout un rucher dès que quelques colonies dépassent les seuils. De manière générale, l'unité sanitaire en apiculture correspond au rucher et non la ruche.**
- Des pics de chute atteignant **plus de 15 varroas** par jour ont été observés dans plusieurs ruchers. Ces colonies seront à suivre de près à la sortie de l'hiver.

Seuils à ne pas dépasser pour le début d'hiver

Niveau d'infestation	Comptage phorétique §	Chute naturelle sur lange graissé
 Faible	VP100* = 0 %	V/J** < 0,5
 Élevée	0 % < VP100 < 0,5 %	0,5 < V/J < 1
 Critique	VP100 > 0,5 %	V/J > 1

*VP100 = Varroas Phorétiques pour 100 abeilles

** V/J = Varroas par jour

§ comptages phorétiques pas conseillés pour cette période

Apicultrices et apiculteurs possédant plus de 150 ruches, contactez nous pour profiter de ce service!
apiculture.frgds-ce@reseaugds.com